



Les femmes et le VIH/sida

Les femmes et les filles subissent de plus en plus le fardeau de l'épidémie du VIH/sida. À la fin de l'année 2006, les femmes représentaient près de la moitié des adultes vivant avec le VIH et le sida. Au cours des deux dernières années, le nombre de femmes vivant avec le VIH a augmenté d'1 million pour passer à 15,4 millions. En Afrique subsaharienne, près de 60 pour cent des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des filles.ⁱ

Les infections par le VIH croissent à une vitesse alarmante chez les femmes et les filles. Les infections par le VIH chez les femmes et les filles augmentent dans toutes les régions du monde. Chaque jour, plus de 3 000 femmes et filles deviennent séropositives.

Les femmes sont particulièrement vulnérables à l'infection par le VIH. En raison d'une combinaison de biologie et de culture, les femmes sont plus prédisposées que les hommes à contracter une infection par le VIH. Dans certaines parties du monde, les jeunes femmes (âgées de 15 à 24 ans) courent un risque d'infection par le VIH trois fois plus grand que pour les jeunes hommes du même âge.ⁱⁱ

Le mariage, longtemps considéré comme un refuge contre l'épidémie, est désormais considéré comme un important facteur de risque. Le fait d'être une femme, mariée et pauvre représente le plus souvent le plus important ensemble de facteurs de risque de contracter le VIH. De nombreuses nouvelles infections par le VIH surviennent chez des femmes mariées ou ayant des relations à long terme avec un seul partenaire.

« Donnez aux femmes et aux filles le pouvoir de se protéger elles-mêmes contre le VIH. Nous sommes déjà confrontés à une récession au niveau des soins. Nous ne pouvons pas laisser le VIH accroître ce fardeau. »

Michel Sidibé
Directeur exécutif, ONUSIDA

Le fardeau d'avoir à s'occuper de ceux qui sont infectés par le VIH retombe sur les femmes et les filles, ce qui les rend encore plus vulnérables. Jusqu'à 90 pour cent des soins dispensés aux personnes vivant avec le VIH proviennent de femmes et de filles.ⁱⁱⁱ De nombreuses dispensatrices de soins disposent de très peu de temps pour gagner un revenu, produire de la nourriture, aller à l'école ou soutenir financièrement leurs familles. Ces dispensatrices de soins, ainsi que leurs familles, courent le plus grand risque d'être mal nourries, en mauvaise santé ou financièrement démunies — tous des facteurs d'augmentation du risque de contraction d'infection par le VIH.

Il existe un besoin urgent de nouvelles options de prévention prises en charge par les femmes. Les options de prévention actuelles du VIH ne suffisent pas pour protéger les femmes. De nombreuses femmes ne possèdent pas le pouvoir nécessaire leur permettant d'insister sur l'utilisation de condoms par leurs partenaires masculins ou sur le fait qu'ils leur demeurent fidèles. L'abstinence n'est pas une option pratique pour les femmes mariées, celles qui souhaitent avoir des enfants ou qui courent le risque de violences sexuelles. Des microbicides sûrs et efficaces pourraient fournir aux femmes un puissant nouvel outil pour se protéger contre le VIH et qui servirait de complément aux méthodes de prévention existantes.

Mars 2009

ⁱ ONUSIDA/OMS « Le point sur l'épidémie du sida », décembre 2007

ⁱⁱ ONUSIDA/OMS « Rapport sur l'épidémie mondiale de sida 2008 », juillet 2008

ⁱⁱⁱ La Coalition mondiale sur les femmes et le sida « Support Women Caregivers: Fights AIDS » (Soutenons les dispensatrices de soins : luttons contre le sida), 2007

IPM Headquarters

8401 Colesville Road, Suite 200
Silver Spring, MD 20910 USA
TEL +1-301-608-2221
FAX +1-301-608-2241

IPM Belgium

Rue du Trône, 98, 3rd floor
1050 Brussels, Belgium
TEL +32(0)2-507-1231
FAX +32(0)2-507-1222

IPM South Africa

PO Box 3460
Paarl 7620, South Africa
TEL +27-21-860-2300
FAX +27-21-860-2308

IPM CTM Facility

3894 Courtney Street, Suite 170
Bethlehem, PA 18017 USA
TEL +1-484-893-1050
FAX +1-484-893-1057

www.ipm-microbicides.org

